

Witches' Broom

Picea Glauca**Popis kultivaru:**

Široko kužeľovitý tvar, vetvičky sú svetlo - zelenej farby.

Pomaly rastúci kultivar, ročne narastie len 2 - 3cm.

Dorastá do maximálnej výšky 1,8m.

Pestuje sa ako solitéra alebo v skupinkách.

Vhodný je do vresovísk a skaliek.

Krajina pôvodu kultivaru:**Vyšľachtený alebo známy od roku:****1994****Meno autora alebo škôlka pôvodu ak sú známe:****Obrizok****Obvyklá výška x šírka vo veku 10r.:****0,4 x 0,4m****Poznámka:****syn. W.B.****Popis druhu:**

Smrek Biely je pomaly rastúci druh pôvodom z Kanady a Aljašky. Dorastá do max. výšky 25m. Koruna je hustá kužeľovitého tvaru, modro - zelenej alebo šedo - modrej farby. Darí sa mu vo vlhkých pôdach na polotienistom až slnečnom stanovisku.

Pestuje sa samostatne alebo v skupinách, využíva sa najmä v parkoch a ako verejná zeleň.



Prihnojovanie - postačujú bežné dostupné kompletne hnojivá ktoré sa aplikujú spôsobom a v dávkach odporučených výrobcami.

Spôsob výsadby a zálievka:

Ihličnany pestované v kontajneroch sa môžu vysádzať počas celého roka ak práve nemrzne najlepšie však na jar alebo na jeseň. Rastlinu sadíme rovnako hlboko ako bola posadená v kontajneri.

Jamu je pred výsadbou potrebné zaliať vodou a po vsiaknutí vystlať substrátom určeným na pestovanie rastlín v kontajneroch alebo substrátom pre ihličnany. Po usadení sa rastlina prihrnie pôdou a znova zaleje.

Na veternejších stanovištiach je potrebné rastlinu po výsadbe fixovať o oporu zo strany prevládajúcich vetrov.

Zálievka - v dobe letných horúčav s minimom zrážok je potrebné rastlinky raz za 3-4 dni výdatne zaliať tak aby bola pôda mokrá aspoň do hĺbky 10-15cm. Rastlinky je potrebné výdatne zaliať aj v zimnom období pred blížiacim sa obdobím mrazov ak pred tým dlhšie nepršalo a pôda je suchá. Ihličnany majú aj počas zimných mesiacov vysokú spotrebú vody ktorú nemôžu zo zamrznutej pôdy čerpať a ak s ňou neboli predzásobené hrozí im počas mrazov vyschnutie.

Najčastejšie choroby a škodcovia:

Smrek Biely je v našich podmienkach odolná a nenáročná rastlina. Všeobecne platí, že rastliny ktorým sa venuje dostatočná pozornosť, sú zlievané a ošetrované sami ľahko odolávajú škodcom a hubovým chorobám.

Významným škodcom sú roztoče ktoré sa vyskytujú najmä na okrasných smrekoch a spôsobujú postupné blednutie, následne zhnednutie (do bledožltohneda) a odumieranie ihlic čo vedie až k úhynu rastliny. Rastlinky je potrebné už vo februári alebo koncom zimy (pokiaľ teplota vystúpi nad 8st.C) ošetriť akaricídmami a potom po 2 týždňoch zopakovať.

Taxonómia - zaradenie v rámci rastlinnej ríše**Oddelenie:** Gymnospermae**Trieda:** Coniferospida**Čeľad:** Pinaceae

Nahosemenné

Ihličnaté

Borovicovité

Rod: Picea**Druh:** Glauca**Kultivar:** **Witches' Broom**

Smrek

Biely

Witches' Broom